

¿Qué prueba se requiere para iniciar la toma de AH?

A

Examen Ginecológico

B

Ecografía transvaginal

C

Análisis de trombofilias

D

Medida de la TA

E

Todo lo anterior

Los AHC

A

Engordan

B

Producen cáncer

C

Alteran el ciclo menstrual

D

Previenen el cáncer

E

Nada de lo anterior

Las adolescentes menores de 16 años y las mujeres mayores de 45 años no necesitan tomar ACH porque non tienen riesgo de embarazo

A

Verdadero

B

Falso

Anticoncepción hormonal

- Mitos
 - Produce esterilidad
 - Hay que esperar un tiempo para que sea efectiva
 - Provoca malformaciones fetales
 - No lo pueden usar ni las mujeres muy jóvenes ni las mayores de 45



Las ventajas añadidas de tomar ACH en mujeres de más de 40 años

A

Mantenimiento de la DMO

B

Mejora del SUA

C

Alivio síntomas VS

D

Reduce la morbilidad perinatal

E

Todo lo anterior

¿qué ATB interaccionan con los ACH?

A

Penicilinas

B

Antifúngicos

C

Rifamicinas

D

Todos

E

Ninguno

¿descansos con los ACH?

A

Por supuesto que sí

B

Anualmente durante un mes

C

Cada dos años durante un mes

D

Cada 5 años durante 3-6 meses

E

No hay motivos para hacer descansos



CONFERENCIA DE CONSENSO 2011

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO CLÍNICO DE LA
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL, INTRAUTERINA Y DE URGENCIA
24, 25 y 26 de noviembre de 2011 Rafael Hotel Mocha MADRID



PREGUNTA 4:

¿Cómo se manejan los olvidos de las píldoras combinadas y solo gestágeno?

RESUMEN RECOMENDACIONES

- ➡ <48 horas: tomarla inmediatamente, independientemente del tipo de AH, sin protección añadida
- ➡ >48 horas: método de barrera 7 días + AU en 1ª semana
- ➡ si quedan menos de 7 píldoras no hacer semana libre



Fertilidad y amenorrea postpíldora

A

El uso a largo plazo produce amenorrea

B

El uso a largo plazo produce subfertilidad

C

El uso a largo plazo protege la reserva ovárica

D

Hay que buscar otras causas de amenorrea y subfertilidad

E

Nada de lo anterior es cierto

Anticoncepción de urgencia



NO es una bomba hormonal

NO es abortiva

NO es teratógena

NO promueve actitudes sexuales de riesgo